

Epilobe en épi  
*Chamerion angustifolium*



CC 3.0 - ARMIN JAGEL


Hysope officinale  
*Hyssopus officinalis*




Bardane  
*Arctium*




Marjolaine  
*Origanum majorana*



Carotte  
*Daucus carota L.*



Epière  
*Stachys sp*



Menthe  
*Mentha*



Phacélie  
*Phacelia tanacetifolia*



CC 3.0

Vipérine  
*Echium vulgare L.*

## Vu pour vous...

### L'Apiculteuse

Plein de poésie et de fraîcheur, L'Apiculteuse est un court-métrage documentaire qui nous emmène dans l'univers optimiste d'une petite fille de 9 ans et demi, Nola. D'un mot d'enfant, pour répondre à la question « qu'est-ce que je peux faire, moi, pour sauver les abeilles ? », elle déclare : « je serai apiculteuse ! ». C'est le point de départ d'une petite histoire qui prend appui sur les problèmes rencontrés par les abeilles pour expliquer ce qu'est une initiative citoyenne européenne. « Une initiative citoyenne européenne est une invitation faite à la Commission européenne de présenter une proposition législative dans un domaine dans lequel l'UE est habilitée à légiférer. L'initiative doit être soutenue par au moins un million de citoyens européens issus d'au moins 7 pays sur les 28 que compte l'Union. »

<http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts>

L'asbl Loupiote qui a encadré le projet est « une équipe de professionnels du cinéma et de pédagogues qui développent des ateliers itinérants d'éducation au et par le cinéma dans les milieux associatifs et scolaires. » <http://www.loupiote.be/>

« La vertu accouplée à la beauté, c'est du miel qui sert de sauce à du sucre »

William Shakespeare,  
Comme il vous plaira (1623)

## ► Récolte d'été

Le miel récolté en période estivale est souvent doté d'un goût plus puissant. Attention à la canicule ! Le miel récolté en période chaude sera chargé de l'humidité provenant de l'eau que les abeilles rapportent à la ruche pour la refroidir. Le miel operculé peut parfois monter au-delà de 20 % d'humidité.

L'ensemencement du miel d'été avec un miel de printemps est recommandé en raison de l'instabilité des miels récoltés à cette époque de l'année.



## ► Traitement d'été et suivi des varroas

Comme chaque année, il est vivement conseillé de faire un suivi des varroas par un comptage quotidien ou hebdomadaire des chutes selon vos possibilités. En principe, le nombre d'acariens devrait diminuer progressivement au fil des semaines. Cette année, il semble que le nombre de varroas soit élevé. Le thymol a manqué d'efficacité. L'amitraz (avec prescription vétérinaire) semble le traitement le plus adapté en présence de couvain. Par ailleurs, BASF vient de sortir un nouveau produit à base d'acide formique, le MAQS®, qui permet de



diffuser cet acide de façon régulière dans la ruche. Le sac déposé sur les cadres est biodégradable. La firme annonce que ce produit ne présente pas de risques de résidus dans les produits de la ruche. Il est commercialisé dans plusieurs pays européens par la firme « NOD Apiary Products » mais pas encore en Belgique. Le passage par un vétérinaire est donc nécessaire.

Nous rappelons que chaque apiculteur qui réalise des comptages peut transmettre ses données au CARI. Ces informations sont très utiles pour l'ensemble des apiculteurs dans le cadre du réseau de surveillance.

À consulter :

<http://www.cari.be/medias/actuapi/actuapi60.pdf>

## ► Evaluation des réserves et nourrissage

Il est conseillé de nourrir le plus tôt possible après la récolte, d'apporter de la nourriture en petite quantité et progressivement aux colonies. Cette année, à l'image de ce qui s'est passé lors de la saison apicole, le retrait des hausses sera sans doute réalisé avec deux à trois semaines d'avance. Il sera possible d'observer en juillet une petite miellée liée à la production de miellat. Lors de la seconde récolte, il faut s'assurer de laisser une réserve suffisante de miel dans les colonies



pour éviter un nourrissage qui hypothéquerait toute possibilité d'autre récolte.

En août, utilisez un sirop de nourrissage 1/1 (et pas du candi à cette époque de l'année). Comptez plus ou moins 10 kg de sucre par colonie (ex. un bidon de 14 kg). Le nourrissage devra être terminé à la mi-septembre pour que les colonies se préparent à l'hiver.

À consulter :

[http://www.cari.be/medias/abcie\\_articles/118\\_nourrissage\\_dhiver.pdf](http://www.cari.be/medias/abcie_articles/118_nourrissage_dhiver.pdf)



## ► Remérage

Certaines colonies doivent être remérées : celles qui ont des reines de 2 ans (risque d'essaimage), des reines de mauvaise qualité (couvain mosaïque par ex.), les colonies orphelines (sans ouvrières pondueuses)... Les mois d'août et de septembre sont les bons moments pour cela !